



UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI UNIVATES  
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO

**COMPARAÇÃO ENTRE AVALIAÇÕES FUNCIONAIS DE  
MEMBROS INFERIORES PRÉ E PÓS-PERÍODO DE PREPARAÇÃO  
EM ATLETAS DE VOLEIBOL FEMININO DE BASE**

Bruna Schlabitz Battisti

Lajeado, novembro de 2018.

# COMPARAÇÃO ENTRE AVALIAÇÕES FUNCIONAIS DE MEMBROS INFERIORES PRÉ E PÓS-PERÍODO DE PREPARAÇÃO EM ATLETAS DE VOLEIBOL FEMININO DE BASE

## COMPARISON BETWEEN FUNCTIONAL ASSESSMENTS OF INFERIOR MEMBERS PRE AND POST PREPARATION PERIOD ON FEMALE VOLLEYBALL ATHLETES BASE

Bruna Schlabitiz Battisti<sup>1</sup>  
Rodrigo Lara Rother<sup>2</sup>

### RESUMO

O voleibol de rendimento evoluiu em diversos aspectos, e, um deles, é a exigência física, que chegou a um patamar que não envolve somente o desejo de jogar bem, mas sim, a soma de diversos requisitos associados às técnicas de treinamento. Em uma partida de voleibol acontecem de 250 a 300 atos motores, representados nos saltos, corridas e quedas. Esta gama variada de exigências, associada à deficiências físicas e/ou posturais, pode levar o atleta a desenvolver algum tipo de lesão. O objetivo do presente estudo é comparar as avaliações funcionais realizadas no pré e pós período de preparação em uma equipe de voleibol de base feminina. A metodologia empregada caracteriza-se como quantitativa, descritiva e transversal, utilizando informações do banco de dados de uma equipe de voleibol feminino, que aplicou o Y Balance Test (YBT) em 12 atletas da categoria infante juvenil. Os resultados foram tabulados em uma planilha Excel, na qual foi calculado o score composto, descritos por meio de média e desvio padrão, e comparados a partir do Teste T de Student pareado. A equipe obteve como média no período pré preparação o score composto para a perna direita 96,37 (dp 5,26) e para esquerda 97,62 (dp 6,25). Dentre as atletas avaliadas, apenas uma (8,33%) apresentou risco de lesão nas duas avaliações realizadas (pré-temporada e pós-preparação), três vezes e meia maior que suas colegas de equipe, com valores de 87,81 para direita e 85,10 para esquerda. Conclui-se que, o risco de lesões da equipe avaliada é baixo, e que as avaliações funcionais de pré e pós-preparação são fundamentais no auxílio à prevenção de lesões de membros inferiores no voleibol.

**Palavras-chave:** Treinamento Esportivo. Avaliação Funcional. Voleibol. Lesões.

### ABSTRACT

Summary: The performance volleyball evolved in many ways, and one of them is the physical requirement, that reached a plateau that does not evolve just the wish of playing well, but, the sum of a lot of associated questions to the training techniques. In a volleyball match, happens 250 to 300 engine acts, represented in the jumps, races and falls. This range varied of requirements associated with physical and/or postural deficiencies can take the athlete to develop some kinds of injuries. The purpose of the present study is to compare the functional evaluations made in the pre and post preparation period in female volleyball athlete base team. The methodology used is characterized as quantitative, descriptive and transversal, using database information from a female volleyball team

---

<sup>1</sup>Graduanda do Curso de Educação Física na Universidade do Vale do Taquari UNIVATES - Lajeado/RS. bruna.s.battisti@gmail.com

<sup>2</sup> Doutor em Ambiente e Desenvolvimento, docente do curso de Educação Física da Universidade do Vale do Taquari UNIVATES – Lajeado/RS. rodrigorothe@univates.br

that applied the Y Balance Test (YBT) on 12 athletes from the youth category. The results were tabulated in an Excel worksheet, calculated the compound score, described by means of average and standard deviation and compared from the T test of Student paired. The team obtained as average in the compound score to the right leg 96,37 (dp. 5,26) and to the left leg 97,62 (dp.6,25). Among the evaluated athletes, just one (8,33%) showed injury risk on both evaluations made (pre-season and post-preparation), three times and a half more than her team partners, with values of 87,81 to the right and 85,10 to the left. It is concluded that the risks of injury from the evaluated team is low and that the functional evaluations of pre and post-preparation are fundamental for the prevention of inferior members injuries help on volleyball.

**Key-words:** Sport Training, Functional Evaluation. Volleyball. Injuries.

## 1 INTRODUÇÃO

O voleibol evoluiu em diversos aspectos desde sua criação. As regras vêm sendo modificadas para que a modalidade se torne cada vez mais atrativa e dinâmica. As exigências técnicas e táticas beiram a perfeição na realização das ações e, fisicamente, nunca se viu antes na história atletas tão altos e com tanta capacidade motora (ANTÔNIO; SANTOS, 2012).

O aspecto físico talvez seja o que mais chama a atenção nesta evolução. Com destaque para as capacidades de força e potência de membros inferiores, já que é imposta a necessidade da realização de inúmeros deslocamentos curtos, velozes e uma grande quantidade de saltos realizados pelos atletas durante os treinamentos e competições (LOMBARDI et al., 2011). Corroboram com essa percepção Franca, Fernandes e Cortez (2004), quando afirmam que o alto nível de desempenho gera sobrecargas corporais intensas com aplicação de força muscular, grandes amplitudes articulares e transferências de peso quase superiores à capacidade humana.

Diante disso, a possibilidade de ocorrência de lesões tem gerado muita preocupação por parte dos profissionais que trabalham com o voleibol, e nos próprios atletas que percebem suas carreiras em risco. Segundo Hootman et al. (2007), 50% das lesões do voleibol ocorrem em membros inferiores, sendo que 30% do total se apresentam como entorses e lesões ligamentares de joelho e tornozelo. Jadhav et al. (2010) identificaram que uma das principais lesões causadas pelo voleibol é na articulação do tornozelo, representando 23% das ocorrências. Dizem ainda os autores citados a cima, que esta articulação sofre altas pressões quando

ocorrem saltos e aterrissagens como os de defesa, armação de jogadas e os movimentos de ataque. Seguindo com o autor Canavan (2001), as lesões no tornozelo representam 25% das contusões no voleibol. Ainda, Pacheco et al. (2000) e Farina (2008) ressaltam que as entorses por inversão do tornozelo são as lesões mais comuns do esporte, também sendo responsável por, aproximadamente, 25% das lesões esportivas e, inclusive, resulta em um grau de instabilidade funcional, devido a redução das forças dos músculos eversores da articulação e da sensibilidade proprioceptivas.

Para evitar a ocorrência de lesões, profissionais integrantes das comissões técnicas atuam na aplicação de testes e avaliações de parâmetros que possam ser indicadores de possíveis lesões futuras. Tubino e Moreira (2003) apresentam as avaliações funcionais como importantes preditores de lesão. Estas avaliações consistem em analisar os padrões fundamentais de movimento e identificar alterações na mobilidade, estabilidade e assimetrias. A correção destes padrões, uma vez conseguida, permite maior eficiência de movimento para o atleta, influenciando em uma melhora no desempenho e diminuição do potencial de lesões (SILVA; ALMEIDA; REGIS, 2017).

Gomes (2009) apresenta que o momento mais indicado para que estas avaliações ocorram é antes ou logo no início da temporada, onde os atletas estão iniciando os treinamentos e podem ser rastreados possíveis fatores de risco de lesões, e combatidos com treinamento preventivo. Para Matveiev (1991), periodizar é a prescrição do treinamento, é organizar uma sequência lógica, buscando harmonia física com a técnica, tática e psicológica. Ainda salienta que, na periodização clássica, esse período é chamado de Preparação e caracteriza-se por utilizar maior volume e menor intensidade nos treinamentos, participação em poucas ou nenhuma competição, estímulos às capacidades físicas básicas e a implementação de estratégias visando a prevenção de lesões. Maffey e Emery (2006) comentam que esta é uma ação muito comum no esporte de alto rendimento.

Cotta et al. (2008) citam a eficiência, o baixo custo e a facilidade na prática da aplicação dos testes como fundamentais para sua realização no esporte. Desta

forma, o Y Balance Test (YBT) apresenta-se como uma opção coerente às necessidades citadas por estes autores.

O YBT tem por característica identificar os desequilíbrios funcionais dos membros inferiores e exige controle postural e proprioceptivo, força muscular e amplitude de movimento da articulação. Além disso, é uma ferramenta de triagem funcional desenvolvida para avaliar a estabilidade dinâmica dos membros inferiores, monitorar o progresso da reabilitação, avaliar os desequilíbrios funcionais após a lesão e identificar atletas com alto risco de lesão, e, igualmente, caracteriza-se como opção para avaliar o equilíbrio postural, identificar deficiências do equilíbrio dinâmico, avaliar efeitos dos treinamentos em atletas saudáveis, e adequado para ser aplicado em pessoas fisicamente ativas, oferecendo medidas confiáveis (HERTEL et al., 2006).

Dallinga, Benjaminse, Lemmink (2012) realizaram uma revisão sistemática com intuito de encontrar ferramentas que poderiam prever o risco de lesões em membros inferiores nos esportes de equipe. Esses autores constaram que o teste funcional do YBT apresenta uma sensibilidade apurada para discriminar jovens do sexo feminino a desenvolverem futuras lesões. Outros estudos mostraram ainda que o este teste apresenta boa sensibilidade para indicar déficits posturais de acordo com os autores Hertel et al. (2006) e Mancini, Horak (2010).

Considerando todos estes aspectos, o objetivo do presente estudo é comparar os desequilíbrios funcionais de membros inferiores nas avaliações pré-temporada e pós-período de preparação em uma equipe de voleibol de base feminina.

## **2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS**

O estudo caracteriza-se como quantitativo, descritivo e comparativo. A partir desta abordagem, foram coletadas informações no banco de dados de uma equipe de voleibol feminino de base do Rio Grande do Sul, composta por 12 atletas, com idade média de 16,5 anos. Essa equipe participa de competições internacionais e

tem revelado em sua história inúmeras atletas que hoje disputam a Superliga nacional e atuam fora do país (Estados Unidos e Europa).

Os treinamentos desta equipe são periodizados segundo o modelo clássico, proposto por Matveiev (1991), realizando um Período de Preparação, caracterizado por treinamentos de maior volume em relação à intensidade. A equipe treina de três a cinco vezes na semana, com cargas onduladas. A média semanal de horas de treinamento é de 12, distribuídas em treinamento técnico tático (nove horas) e físico (três horas). O treinamento físico ocorre na academia (musculação para treino de força e potência) e na quadra (exercícios funcionais de propriocepção, equilíbrio, flexibilidade, resistência muscular localizada e agilidade), sendo esse segundo local o mesmo do treinamento técnico/tático.

O Período de Preparação ocorreu do dia três de março a 11 de maio de 2018, sendo estes dias marcados pela realização de avaliações funcionais. Estas avaliações foram denominadas como “Pré-preparação” e “Pós-preparação”.

Dentre os testes realizados pela equipe e disponíveis no banco de dados, foi escolhido o YBT, pois representava a avaliação mais condizente com a predição de lesões de membros inferiores. O qual apresenta a capacidade de quantificar o desempenho do atleta de acordo com a distância durante os alcances realizados na direção Anterior (A), Pósterio Lateral (PL) e Pósterio Medial (PM), enquanto realizam equilíbrio uni podal. Essas direções condizem com os planos de movimento (frontal, transversal e sagital) e, portanto, apresenta formato da letra Y. De acordo com a descrição contida no banco de dados, o procedimento de avaliação do YBT foi composto por três fitas métricas coladas no chão com fita adesiva e separadas por um goniômetro em um ângulo de 45 graus. Com as atletas descalças e em pé no centro do Y em apoio uni podal, com as mãos na cintura e com o membro inferior que não estava apoiado no solo, tocava sutilmente a distância máxima alcançada com a ponta do pé sobre a fita métrica, sendo que o membro a ser avaliado era o qual mantinha-se fixo no solo, e não o membro que movia-se nas três direções do teste. As medidas foram realizadas na direção anterior com o membro inferior direito e esquerdo, seguindo pelas outras direções: pósterio lateral e pósterio medial, sendo realizadas três medidas para cada membro em cada direção. A avaliada retornava

então para a posição inicial, enquanto mantinha o equilíbrio. As instruções, tanto verbais, como visuais, de como funcionaria o teste, foram dadas a todos os sujeitos antes da avaliação. Além disso, cada atleta realizou três experimentações da prática em cada uma das direções, para que fossem familiarizadas com o teste.

O YBT era interrompido nos casos em que o pé de apoio fosse movido e a mão fosse retirada da cintura, sendo novamente posicionado o sujeito, e repetia-se o teste, além de quando a comissão técnica percebia que o pé que deveria alcançar a maior distância apoiasse de forma não sutil à fita e/ou quando a atleta se desequilibrasse em qualquer ponto durante a execução.

A máxima das três distâncias alcançadas por cada membro inferior e em cada uma das três direções foi anotada para posteriormente calcular o Score Composto, um valor expressado em percentual que considera todas as direções do movimento usadas no YBT. Desta forma, realizou-se uma análise de todas as distâncias em centímetros alcançadas pelas atletas, validadas pela comissão técnica e, em seguida, registradas em uma planilha. Além disso, foi realizada a medição do comprimento dos membros inferiores, onde cada atleta era avaliada individualmente. Estas foram instruídas a permanecer deitadas em uma superfície plana e estável (maca) para que se concretizasse a coleta. A medida foi realizada pela distância entre a espinha ilíaca ântero superior e o maléolo medial, e, após, eram anotadas as distâncias em centímetros na ficha correspondente à avaliada. O Score Composto final é baseado na divisão entre a soma da distância máxima de alcance nas direções anterior, póstero medial e póstero lateral, por três vezes o comprimento do membro da atleta e, por fim, multiplicado por cem:  $[(\text{Máx. Anterior} + \text{Máx. Póstero Medial} + \text{Máx Póstero Lateral}) / (\text{Comp. Perna} \times 3)] \times 100$  (FILIPA et al., 2010).

Os resultados do YBT foram tabulados em planilha Excel e descritos por meio de média e desvio padrão. A comparação entre as médias foi realizada por meio de Teste T de Student pareado, adotando um nível de significância de  $p < 0,05$ .

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES, sob parecer número 2.781.529.

#### 4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os dados coletados com a utilização do YBT na avaliação pré e pós-preparação, bem como o cálculo do Score Composto e as diferenças existentes entre os valores do YBT encontrados nos membros inferiores direito e esquerdo, podem ser observados na Tabela 1.

Além disso, seguimos os conceitos dos autores Butler et al. (2013), Smith, Chimera e Warren (2015) e Gonell, Romero e Soler (2015), Gribble, Hertel e Plisky (2012), os quais citam em seus estudos que atletas que apresentam Scores Compostos menores que 89,6% tem três vezes e meia mais chances de ocorrerem lesões, ainda mostram que atletas que apresentam diferença entre valores MID e MIE maiores que quatro centímetros tem chances triplicadas de ocorrer lesões, complementando que até 6% de diferença entre os Scores Compostos de MI ou diferença de 4 cm entre os mesmos são consideradas normais, ou seja, acima destes valores há probabilidade de ocorrerem lesões.

Os valores aqui obtidos para o YBT foram utilizados para cálculo do Score Composto. Para esta variável, a avaliação pré-preparação apresentou como média de membro inferior direito (MID) valor de 96,37% (dp 5,26) e para membro inferior esquerdo (MIE) 97,62% (dp 6,25). Dentre as atletas avaliadas, uma mesma atleta foi a que apresentou os valores mais baixos tanto para MID (87,81%) quanto para MIE (85,10%). Além apenas uma atleta apresentou diferença significativa (6,05%) quando comparados Score Composto de MID e MIE. Já quando comparados os valores de YBT para as três avaliações de MID e MIE, sete atletas apresentaram diferenças significativas (>4cm) em pelo menos uma das três direções avaliadas no teste.

**Tabela 1** - Médias dos resultados do YBT, Score Composto e Diferenças entre MMII direito e esquerdo nas avaliações Pré e Pós-período de preparação, em equipe feminina de voleibol de base.

PERÍODO	Y BALANCE TEST PROPRIOCEPÇÃO (cm)						Score Comp. D (%)	Score Comp. E (%)	Diferenças		
	D-AN	D-PM	D-PL	E-AN	E-PM	E-PL			AN D-E (cm)	PM D-E (cm)	PL D-E (cm)
Pré Prep. (dp)	84,67 (5,79)	89,50 (5,4)	88,08 (7,56)	84,25 (5,36)	90,00 (7,52)	91,58 (6,53)	96,37 (5,26)	97,62 (6,25)	0,42 (3,15)	0,5 (3,94)	3,5 (5,47)
Pós Prep. (dp)	85,17 (4,57)	87,25 (5,67)	92,17 (5,84)	84,83 (4,13)	88,00 (6,51)	94,00 (5,58)	97,33 (5,77)	97,88 (6,38)	0,33 (2,81)	0,75 (4,41)	1,83 (3,61)
Teste T	0,33	0,12	0,04	0,26	0,12	0,09	0,27	0,17	0,44	0,15	0,11

D-AN= Anterior com membro direito; D-PL= Pósterio lateral com membro direito; D-PM= Pósterio medial com membro direito; E-AN= Anterior com membro esquerdo; E-PM= Pósterio medial com membro esquerdo. E-PL= Pósterio lateral com membro esquerdo.

Fonte: Os autores (2018).

A avaliação pós-preparação apresentou como média do Score Composto de MID valor de 97,33% (dp 5,77) e para MIE 97,88% (dp 6,38). Dentre as atletas avaliadas, uma atleta novamente apresentou o valor mais baixo, mas desta vez somente para MIE (85,10%). Na avaliação deste período quatro atletas apresentaram diferença significativa (>6%) quando comparados Score Composto de MID e MIE. Já quando comparados os valores de YBT para as três avaliações de MID e MIE, cinco atletas apresentaram diferenças significativas (>4cm).

Comparando todas variáveis avaliadas entre os períodos de pré e pós-preparação, a análise estatística encontrou diferença significativa somente para D-PL ( $p=0,04$ ) no sentido de melhora no alcance do YBT a favor da pós-preparação. Também vale ressaltar que diminuíram de sete (pré) para cinco (pós) as atletas que apresentaram diferenças maiores que 4 cm entre MID e MIE no YBT e a atleta que havia valores baixos em ambos MI melhorou em um deles.

## 5 DISCUSSÃO

Partindo dos estudos de Marwan et al. (2012) se percebe o voleibol como a modalidade em que mais ocorrem lesões de membros inferiores (73,1%) e articulares (43,6%) quando comparado aos outros esportes com bola. Butler et al. (2013) corroboram com essa afirmação exemplificando o uso do YBT e calculando o Score Composto como fator de identificação prévia de risco de lesões. Os autores

afirmam que atletas que apresentam Scores Compostos menores que 89,6% tem três vezes e meia mais chances de ocorrerem lesões. Já os estudos de Smith, Chimera e Warren (2015) e Gonell, Romero e Soler (2015) mostram que atletas que apresentam diferença entre valores MID e MIE maiores que quatro centímetros obtidas com o YBT tem chances de lesão triplicadas quando comparados com atletas que apresentam maior equilíbrio entre os valores. Plisky et al. (2006) concordam com estes valores encontrando em seus estudos médias de assimetria anterior e pósterolateral de 4,3 e 4,0 centímetros.

Na equipe de voleibol investigada, somente uma atleta apresentou situação de risco, para MID e MIE na avaliação pré-preparação e MIE na pós-preparação. Quanto às diferenças MID e MIE nas avaliações do YBT, na pré-preparação sete atletas apresentaram valores de riscos acima dos apresentados pela literatura e na avaliação pós-preparação cinco atletas apresentaram esse risco.

Estudos de Plisky et al. (2006) encontraram valores de desempenho de 235 atletas universitários de basquete do sexo masculino e feminino durante a temporada de 2004 e 2005. Atletas do sexo masculino que tiveram assimetria >4 cm na direção anterior tiveram 2,5 vezes mais chances de se lesionarem durante a temporada. Já as atletas do sexo feminino em que o score composto foi menor que 94% tiveram 6,5 vezes mais risco. Ainda os autores Gribble, Hertel e Plisky (2012) complementam que até 6% de diferença entre os Scores Compostos de MI ou diferença de 4 cm entre os mesmos são consideradas dentro dos padrões, ou seja, acima destes valores há probabilidade de ocorrerem lesões.

Os autores Correa e Linden Junior (2016) avaliaram, em 20 atletas amadoras de voleibol, o controle postural dinâmico antes e após treinamento, onde os resultados não apresentaram variações significativas no controle postural dinâmico antes e após o treino, tendo assim semelhança entre os valores e comparações apresentados neste estudo com os salientados pela literatura.

Hale, Hertel e Olmsted-kramer (2007) descreveram a utilização de um teste (SEBT) que caracteriza-se semelhante ao YBT. Estes autores estudaram o pré e pós teste em indivíduos submetidos a um período de quatro semanas de tratamento,

devido a instabilidade crônica de tornozelo. Na avaliação dos valores médios, observou-se diferença significativa no Score Composto ao comparar o lado lesionado ( $70,54 \pm 7,70$  cm) com o lado sadio ( $67,45 \pm 7,69$  cm,  $p=0,0003$ ). Fato não observado para o grupo controle ao comparar o membro inferior direito ( $69,31 \pm 7,05$  cm) com o esquerdo ( $69,60 \pm 7,59$  cm,  $p=0,5258$ ). Na comparação entre os grupos também não houve diferença significativa ( $p>0,05$ ) no Score Composto, assim sugerido o reteste como forma de avaliar o desempenho funcional e reavaliação do controle neuromuscular. Já no estudo de Artioli et al. (2011), os quais avaliaram indivíduos submetidos a tratamento fisioterapêutico pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior, obtiveram como valores médios do Score Composto para o membro lesionado  $73,66 \pm 8,13$  cm e no membro inferior sadio de  $74,43 \pm 8,31$  cm. Para o grupo controle ao comparar os lados direito e esquerdo, não houve alterações significantes ( $p > 0,05$ ). A média geral no MID foi de  $71,12 \pm 7,46$  cm e no MIE de  $71,52 \pm 8,22$  cm, sendo que comparando os grupos, não houve diferença significativa.

Já Manha, Silva e Fusaro (2018) avaliaram o controle sensório motor com o YBT em mulheres praticantes de corrida. Foi encontrada uma correlação positiva moderada de Pearson entre o tempo de prática e os Scores Compostos dos membros dominantes  $r=0,4701$  e  $p=0,0422$  e não dominantes  $r=0,4743$  e  $p= 0,0402$  e uma correlação positiva fraca de Pearson entre o tempo de prática e a soma das medidas de alcance do membro dominante  $r=0,3774$  e  $p=0,1226$  e não dominante  $r=0,3838$  e  $p=0,1159$ .

## **6 CONCLUSÃO**

A incidência de lesões no meio esportivo é um tema preocupante, em boa parte devido ao aumento de jovens inseridos na prática. Além disso, um fator de aumento das lesões é devido ao mau planejamento e falta de avaliações associadas a predição de lesões. Os resultados aqui encontrados suportam a ideia de que testes funcionais são fundamentais para a identificação de futuras lesões em atletas. O YBT é um teste confiável, seguro e de baixo custo, portanto uma boa opção.

Quanto à equipe avaliada, apresentou apenas uma atleta com risco de lesão quando considerado o Score Composto obtido. Ainda assim, a mesma reduziu pela metade seu risco, que no pré era em ambos os MI e no pós somente MIE. Considerando os valores de YBT também reduziram-se os atletas em risco de sete para cinco. Estes números apontam na direção de pouco risco de lesão na equipe, além de ter diminuído com o treinamento de período de preparação.

Pode-se concluir que o objetivo do presente estudo foi alcançado, identificando e comparando os desequilíbrios funcionais de MI nas avaliações pré e pós período de preparação. As diferenças encontradas foram poucas e não podem ser explicadas somente a partir dos valores aqui obtidos, assim sendo sugeridas futuras investigações.

## REFERÊNCIAS

- ANTÔNIO, V. de S.; SANTOS, M. A. G. N. dos. Prevalência de lesões em atletas de voleibol feminino e possíveis relações com treinamento inadequado e estresse. **Revista Hórus**, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 57-69, 2012.
- ARTIOLI, D. P. et al. Teste de controle neuromuscular em indivíduos submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior e em tratamento fisioterapêutico avançado. **Rev Bras Clin Med**, São Paulo, v. 9, n. 4, p. 269-273, 2011.
- BUTLER, R. J. et al. Dynamic Balance Performance and Noncontact Lower Extremity Injury in College Football Players: An Initial Study. **Sports Health**, v. 5, n. 5, p. 417-422, 2013.
- CANAVAN P. **Reabilitação em medicina esportiva**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2001.
- CORREA, D. R.; LINDEN JUNIOR, E. Avaliação do controle postural dinâmico em atletas amadoras de voleibol antes e após treinamento. **Revista Simpósio de Fisioterapia – Uniplac**, v. 3, p. 164-170, 2016.
- COTTA, R. et al. Utilização dos testes de salto vertical e salto horizontal para prescrição de treinamento pliométrico. **Revista Digital**. v. 14, n. 131, p. 1-8, 2008. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd131/prescricao-de-treinamento-pliometrico.htm>>. Acesso em: 23 jun. 2018.
- DALLINGA, J.M.; BENJAMINSE, A.; LEMMINK, K.A. Which screening tools can predict injury to the lower extremities in team sports?: a systematic review. **Sports Med**. v. 42, n. 9, p. 791-815, 2012.

FARINA, E. C. R. Risco de lesões na região do tornozelo em jogadores de voleibol: proposta de prevenção. **EF y Deportes**. Buenos Aires, v. 12, n. 117, 2008. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd117/riscos-de-lesoes-na%20regiao-do-tornozelo-em-19-jogadores-de-voleibol.htm>>. Acesso em: 30 mai. 2018.

FILIPA, A. et al. Neuromuscular Training Improves Performance on the Star Excursion Balance Test in Young Female Athletes. **Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy**, [s.l.], v. 40, n. 9, p.551-558, set. 2010. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy (JOSPT). Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.2519/jospt.2010.3325>>. Acesso em: 30 mai. 2018.

FRANCA, D; FERNANDES, V. S; CORTEZ, C. M. Acupuntura cinética como efeito potencializador dos elementos moduladores do movimento no tratamento de lesões desportivas. **Revista Fisioterapia Brasil**, v. 5, n. 2, p. 111- 118, 2004.

GOMES, A. C. **Treinamento desportivo: Estruturação e periodização**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GONELL, A. C.; ROMERO, J. A. P.; SOLER, L. M. RELATIONSHIP BETWEEN THE Y BALANCE TEST SCORES AND SOFT TISSUE INJURY INCIDENCE IN A SOCCER TEAM. **The International Journal Of Sports Physical Therapy**, v. 10, n. 7, p. 955-966, 2015.

GRIBBLE, P. A.; HERTEL, J.; PLISKY, P. Using the Star Excursion Balance Test to Assess Dynamic Postural-Control Deficits and Outcomes in Lower Extremity Injury: A Literature and Systematic Review. **Journal Of Athletic Training**, [s.l.], v. 47, n. 3, p. 339-357, maio 2012. Journal of Athletic Training/NATA. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.4085/1062-6050-47.3.08>>. Acesso em: 30 mai. 2018.

HALE, S. A.; HERTEL, J.; OLMSTED-KRAMER, L. C.. The Effect of a 4-Week Comprehensive Rehabilitation Program on Postural Control and Lower Extremity Function in Individuals With Chronic Ankle Instability. **Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy**, v. 37, n. 6, p. 303-311, 2007.

HERTEL, J.; BRAHAM, R. A.; HALE, S. A.; OLMSTED-KRAMER, L. C. Simplifying the Star Excursion Balance Test: Analyses of Subjects With and Without Chronic Ankle Instability. **Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy**, v. 36, n. 3, p. 131-137, 2006.

HOOTMAN, J. M.; DICK, R.; AGEL, J. Epidemiology of Collegiate Injuries for 15 Sports: Summary and Recommendations for Injury Prevention Initiatives. **Journal Of Athletic Training**, v. 42, n. 2, p. 311-319, 2007.

JADHAV, K. G. et al. A Survey of Injuries Prevalence in Varsity Volleyball Players. **Journal of Exercise Science and Physiotherapy**, v. 6, n. 2, p. 102-105, 2010.

LOMBARDI, G.; VIEIRA, N. S.; DETANICO, D. Efeito de dois tipos de treinamento de potência no desempenho do salto vertical em atletas de voleibol. **Brazilian Journal of Biomotricity**, v. 5, n. 4, p. 230-238, 2011.

MAFFEY, L.; EMERY, C. PHYSIOTHERAPIST DELIVERED PREPARTICIPATION EXAMINATION: RATIONALE AND EVIDENCE. **North American Journal Of Sports Physical Therapy: NAJSPT**, v. 1, n. 4, p. 176-186, 2006.

MANCINI, M.; HORAK, F.B. The relevance of clinical balance assessment tools to differentiate balance deficits. **Eur.J Phys Rehabil Med.** v. 46, n. 2, p. 239-48, 2010.

MANHA, C. de C. S.; SILVA, G. M. G. da; FUSARO, C. **Avaliação do controle sensório-motor com teste y-balance em mulheres praticantes de corrida de rua.** 2018. 41 f. Monografia (Graduação) - Curso de Fisioterapia, Universidade São Francisco, Bragança Paulista, 2018.

MARWAN, Y. et al. Sports Injuries among Professional Male Athletes in Kuwait: Prevalence and Associated Factors. **Medical Principles And Practice**, [s.l.], v. 21, n. 2, p. 171-177, 2012. S. Karger AG. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1159/000332442>>. Acesso em: 30 mai. 2018.

MATVEIEV, L. P. **Fundamentos do treino desportivo.** 2ª ed. Lisboa: Livros Horizonte, p. 317, 1991.

PACHECO, I. CABRAL, S. Avaliação do uso de 3 diferentes tipos de tratamentofarmacológico na entorse de tornozelo em atletas. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte.** v. 6, n. 5, p. 211, 2000.

PLISKY, P. J. et al. Star Excursion Balance Test as a Predictor of Lower Extremity Injury in High School Basketball Players. **Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy**, v. 36, n. 12, p. 911-919, 2006.

SILVA, K. M. A. da; ALMEIDA, T. G. de; REGIS, J. de F. Avaliação funcional do movimento em atletas de duas seleções de voleibol da região do vale do Jaguaribe/CE. **Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia**, Ceará, v. 8, n. 1, p. 3-27, 2017.

SMITH, C. A.; CHIMERA, N. J.; WARREN, M. Association of y balance test reach asymmetry and injury in division I athletes. **Medicine and science in sports and exercise**, v. 47, n. 1, p. 136-141, 2015.

TUBINO, M. J. G.; MOREIRA, S. B. **Metodologia Científica do Treinamento Desportivo.** 13. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.

## **Revista Destaque Acadêmicos UNIVATES**

### **Diretrizes para Autores**

Revista Destaque Acadêmicos é uma publicação trimestral da UNIVATES. Tem por objetivo divulgar pesquisas e trabalhos diversos de docentes e discentes. Trata-se de publicação on-line e apresentará artigos, resenhas e comunicações científicas vinculados à natureza da publicação e à temática da cada edição. Anualmente cada Centro terá um exemplar sob sua responsabilidade de organização e finalização, seguindo-se a ordem: 1º trimestre – Gestão Organizacional, 2º trimestre – Ciências Humanas e Sociais, 3º trimestre – Ciências Biológicas e da Saúde e 4º trimestre – Ciências Exatas e Tecnológicas.

### **Condições para submissão**

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

1. Os artigos, resenhas e comunicações científicas devem estar vinculados à natureza da publicação e à temática de cada edição.
2. Os artigos devem ter de 08 até 20 páginas (incluindo notas de rodapé, anexos e referências), digitadas em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, com espaço entre linhas de um e meio.
3. Os artigos devem respeitar a seguinte estrutura: a) título na língua do texto; b) nome(s) do(s) autor(es) com nota de rodapé informando referências acadêmicas (formação, titulação, instituição) e profissionais (cargo que ocupa); c) resumo na língua do texto; d) palavras-chave na língua do texto; e) introdução; f) desenvolvimento; g) conclusão; h) referências; i) apêndice(s) (se houver); j) anexo(s) (se houver).
4. Os originais devem ser submetidos em **FORMATO EDITÁVEL** (.doc, .odt...). Opcionalmente pode-se adicionar uma versão do trabalho em formato

fechado (pdf), na etapa Documentos suplementares. O tamanho máximo por arquivo é 10MB.

5. As referências bibliográficas devem seguir os padrões da ABNT (NBR 6023/2002) e estarem dispostas em ordem alfabética, de acordo com o sistema utilizado para citação no texto (SISTEMA AUTOR-DATA, NBR 10520/2002), no final do trabalho. As notas de rodapé são utilizadas EXCLUSIVAMENTE para notas explicativas, devendo ser numeradas e inseridas na página em que estiverem alocadas.
6. Mais orientações podem ser obtidas no Manual da Univates para trabalhos acadêmicos, disponível em "<http://www.univates.br/editora-univates/publicacao/110>", essas orientações são baseadas, em sua maioria, nas normas ABNT.
7. Conselho Editorial da Revista reserva-se o direito de aceitar, ou não, os trabalhos enviados, informando ao autor se o artigo será ou não publicado. A publicação não implica em espécie alguma de remuneração.
8. A qualidade da apresentação do trabalho bem como seu conteúdo e originalidade, são responsabilidades exclusivas do(s) autor(es). O(s) autor(es), ao encaminharem os trabalhos, cedem à Univates os respectivos direitos de reprodução e publicação. Os casos omissos serão resolvidos pelos editores científicos do periódico.

### **Declaração de Direito Autoral**

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:

- A. Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
- B. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.

C. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja [O Efeito do Acesso Livre](#)).

### **Política de Privacidade**

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.